

ไข่เลือดออก

ป้องกันได้

ยุงลาย

เป็นพาหะ



ปิด...ฝาภาชนะ

เปลี่ยน...น้ำในภาชนะ

ปรับปรุง...สิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำขัง

ป้องกัน...ใช้ทรายอะเบท
ใช้ยาฆ่าลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ
ใช้สารเคมีพ่นตามบ้าน



ป้องกันส่วนบุคคล...

ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
ใช้กลั่นกันยุง



คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Medicine, Burapha University

ไข้เลือดออก ป้องกันได้ ยุ่งลาย เป็นพาหะ



อาการ



1. ไข้สูงลอย 39-40 องศา ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
ประมาณ 4-5 วัน



2. อาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน มีจุดเลือดออก
ตามร่างกาย

3. ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา

4. ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือ อาการช็อค เกิดในช่วง
ไข้ลด กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ

การรักษาเบื้องต้น

1. ให้ยาลดไข้ ที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล

2. ให้สารน้ำชดเชย ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อย ๆ ในรายที่มีการขาดน้ำ

3. ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ กระสับกระส่าย
มือเท้าเย็น คลื่นไส้อาเจียน ในช่วงไข้ลด

ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ปรีกษาแพทย์เมื่อมีอาการสงสัยไข้เลือดออก



คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Medicine, Burapha University